

## 多次使用藥品開封後保存期限

### 一、通則

藥品分類間	開封後保存條件	開封後保存時間
眼用藥 (如：眼藥水、眼藥膏)	室溫	1 個月
口服藥水 (需泡製之抗生素糖漿除外)	室溫	1 個月
外用藥膏	室溫	6 個月
外用藥水 (如：金碘)	室溫	2 個月

### 二、特殊藥品保存期限

商品名	成分劑量	儲存 (開封後)	備註
0.5% Alcaine	( Proparacaine ) Alcaine eye solution 0.5% 15 ml	避光冷藏 若無污染或變質, 開封後 1 個月	顏色由澄清變黃即丟棄 (外用藥)
Heparin	Heparin Sodium 5000U/ml 5ml/vial	已稀釋之溶液 24 小時內使用 開封後冷藏儲存 14 天。	含有保存劑 (Benzyl alcohol)
Innohep	Tinzaparin Na. 20000anti-XaIU/2ml/vial	開封後室溫保存 28 天。	
Marcaine	Bupivacaine 0.5%, 20ml/vial	不含防腐劑, 經開封後應立即使用, 餘剩應丟棄。	
Mydrin-p	Tropicalmide 0.5%, phenylephrine HCl 0.5%*10ml	避光陰涼處, 若無污染或變質, 開封後 1 個月保存。	
NTG/sublingual tab	Nitroglycerin. 0.6mg/tab	避光室溫儲存, 開封後, 6 個月	原瓶罐中保存
Xylocain 2% 20ml (Local)	Lidocaine HCl 2% 20ml (Local)	若無污染或變質, 開封後室溫保存 3 天。	含有保存劑 (Methyl-paraben)
Xylocain-E 2% 20ml inj	Lidocaine HCl-E 2% 20ml inj	若無污染或變質, 開封後室溫保存 3 天。	含有保存劑 (Methyl-parahydroxybenzoate)
Xylocain jelly 2%*30gm FUJISAWA	Lidocaine HCl jelly 2%*30gm	開封後室溫保存 1 個月	外用藥
Xylocaine 10% spray	Lidocaine HCl 10% spray	開封後室溫保存 1 個月	外用藥
Humulin N 1000iu inj.		一旦使用可最多至 28 天, 超過這個期間不能使用。小瓶貯存不能超過 30°C	
Humulin R 1000iu inj.		一旦使用可最多至 28 天, 超過這個期間不能使用。小瓶貯存不能超過 30°C	
Mixtard 30-HM inj. 100iu/ml 10ml		一旦使用可最多至 28 天, 超過這個期間不能使用。小瓶貯存不能超過 30°C	
Penicillin skin test 1000U/ml		配製或稀釋後貯存 2-8°C, 7 天。(依瓶身標籤上有效期限)	