

# 甲狀腺疾病 用藥指導

李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院  
藥劑科 關心您



藥物諮詢專線：04-26862288轉3117  
李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院

## 甲狀腺功能亢進之藥物治療

### 一、治療甲狀腺功能亢進（過高）之藥物：

1. Propylthiouracil (Procil)
2. Methiomazole (Tapazole)

### 二、抗甲狀腺藥物可能副作用包括：

1. 皮膚搔癢或皮疹約 5%，是最常見之副作用。部份患者持續服用，症狀會改善。
2. 關節痛
3. 類紅斑狼瘡症狀
4. 肝功能暫時異常
5. 貧血、凝血功能變差或血小板減少
6. 顆粒性白血球缺少：約 0.5% 需立即求診

### 三、述副作用中，特別值得注意的是顆粒性白血球缺少，常在治療期間 3 個月內突然發生，但也有可能發生於 3 個月後之任何時間。定期白血球檢查並

無法預防，所以如果有任何發燒或發炎現象，尤其是喉嚨發炎必須馬上就醫並檢驗白血球，如果白血球總數在 1500 以下，必須立刻停藥並儘速至門診求治，至於在血液血球總數 1500-3000 間，是否要停藥，雖無急迫性，但您需儘速與醫師討論是否使用其它治療甲狀腺亢進的方法。

### 四、如果有下列副作用，也必須把藥物停止並求診治療。

1. 顆粒性白血球缺乏症
2. 嚴重之全身性皮膚疹
3. 膽汁滯留性黃膽，肝炎或急性關節痛

## 甲狀腺機能低下之藥物治療

### 一、治療甲狀腺機能低下(過低)之藥物：

Eltroxin(Thyroxine sodium) 100mcg/tab

### 二、注意事項

1. 甲狀腺素會受食物影響其吸收，故服用甲狀腺素時，須於飯前服用。

2. 懷孕、準備懷孕及欲哺乳之患者，請先告知醫師。
3. 如有服用抗凝血劑、強心劑、抗痙攣藥物(如 Carbamezapin、phenytoin)、口服避孕藥或抗糖尿病藥物的患者，請先告知醫師。
4. 未與醫師確認前勿自行停藥。
5. 藥品應避光、乾燥、室溫保存。

### 三、副作用：

使用過量時可能會有下列副作用：心絞痛、心律不整、心悸、骨骼肌痛性痙攣、心搏過速、腹瀉、嘔吐、震顫、不安、興奮、失眠、頭痛、潮紅、發汗、體重劇減、肌肉無力，通常只要降低劑量或停藥數天即可消失。